

HOLD UDKIG EFTER DE SÆDVANLIGE SYMPTOMER



CUSHINGS SYNDROM BEHANDLINGSDAGBOG

Nu hvor din hund har fået stillet en diagnose, er det vigtigt, at du fortsætter med at indsamle beviser til din dyrlæge. Uanset om det drejer sig om Leaky Larrys urinering eller Lazy Lynns sløvhed, så er det bedst, jo mere din dyrlæge ved.

Denne logbog vil hjælpe med at holde din hund gladere og sundere.

Behandlingsdagbog

Denne dagbog gør det let og enkelt for dig at følge din hunds effekt af behandlingen med Vetoryl. Ved nøje at følge og dermed kunne forbedre din hunds behandling, er der gode muligheder for, at den får en bedre livskvalitet, et bedre helbred og en reduceret risiko for at få følgesygdomme.

Med tiden vil du se en forbedring af de symptomer, der er forbundet med sygdommen.

Det er vigtigt at have godt styr på ændringer i hundens adfærd og udseende, så du kan hjælpe dyrlægen med at vurdere, hvordan behandlingen virker. Nedenfor er de fire vigtigste kliniske tegn, som du skal holde øje med, anført:

Tørst og vandladning

- Cushings syndrom forårsager øget tørst og vandladning.

Appetit

- En overproduktion af kortisol gør hunden ekstra sulten.

Udseende

- Pels: Nogle hunde med Cushings syndrom taber pelsen, og mange hunde får en mat og tør pels.
- Hud: Hunde med Cushings syndrom får ofte tør og skællende hud.
- Tøndeformet mave: Hunden får ofte en oppustet og udspilet mave.

Aktivitetsgrad

- Cushings syndrom kan forårsage træthed og inaktivitet. Efter behandlingsstart ses der ofte en hurtig bedring af dette hos hunden, som igen vil blive mere opmærksom og glad.

Hvordan kan jeg hjælpe min dyrlæge?

Det er vigtigt, at din dyrlæge får et klart billede af, hvordan din hund har haft det, og hvordan den har reageret på sin medicin, siden sidste konsultation. Udviser hunden stadig symptomer på Cushings syndrom? Forbedres hundens tilstand som forventet? Ved hver opfølgende konsultation tilpasses og justeres behandlingen, så den passer præcis til din hund og dens situation.

Dyrlægen vil også sikre sig, at hunden ikke udviser tegn på, at den bliver utilpas af medicinen.

Hvis hunden udviser sygdomstegn, såsom træthed, opkastning, diarré eller nedsat appetit, under behandlingen, skal du omgående stoppe behandlingen og kontakte din dyrlæge hurtigst muligt. Dyrlægen vil fortælle dig, hvad du skal gøre

Skemaet "Cushings syndrom - klinisk vurdering" er meget nyttig, når dyrlægen skal vurdere, hvordan din hund reagerer på behandlingen. Udfyld derfor dette skema forud for hver opfølgingskonsultation hos dyrlægen.

Vurdering af livskvalitet

Du kan også blive bedt om at vurdere, hvilken indvirkning sygdommen og medicinen har på din hunds og din hverdag ved at udfylde livskvalitetsskemaet.

Her stilles der spørgsmål om din hunds tørst og sult, vandladning, vægt, humør, energiniveau, lyst til at lege, huden og pelsens tilstand, mobilitet, daglige rutiner og kontakten med dig som kæledyrsejer.

Spørgeskemaet om livskvalitet findes til sidst i denne behandlingsdagbog og bør udfyldes hver tredje måned.



Information om min hund

Hundens navn: _____

Race: _____

Fødselsdato: _____

Foder: _____

Køn: _____

Neutraliseret: ja / nej _____

Behandlende dyrlæge: _____

Dyreklinik/dyrehospital: _____

Telefon: _____

Konsultationer hos dyrlægen:

Dato	Tid	Årsag til konsultation	Aftalt plan (dosisændring, doseringshyppighed osv.)

Cushings syndrom – klinisk vurdering

Dette er de kliniske symptomer, der er vigtigst at vurdere hos en hund med Cushings syndrom. Behandlingsdagbogen vil hjælpe dig med at holde styr på de "point", du giver i forbindelse med din kliniske vurdering af hunden. Det er vigtigt, at du deler følgende oplysninger med din dyrlæge ved hver opfølgingskonsultation:



Tørst og vandladning

- 0= Drikker og urinerer normale mængder.
- 1= Drikker og urinerer lidt mere end normalt.
- 2= Drikker og urinerer mere end normalt.
- 3= Drikker og urinerer hele tiden.



Appetit

- 0= Spiser normalt.
- 1= Spiser hurtigere og mere end normalt.
- 2= Glad for mad, spiser hurtigt og tigger om mere mad.
- 3= Udviser enorm/hysterisk interesse for mad



Udseende

- 0= Ser normal ud.
- 1= Let forringet pels- og hudkvalitet.
- 2= Dårlig pels- og hudkvalitet +/- let udspilet mave.
- 3= Betydeligt pelstab +/- udspilet mave.



Aktivitetsniveau

- 0= Normalt aktivitetsniveau.
- 1= Ikke helt sig selv.
- 2= Ikke sig selv +/- pusten/gispen i hvile.
- 3= Ikke sig selv, svag +/- konstant pusten/gispen.

For mere information se
www.mistankeomcushings.dk

Kliniske Cushing-point

Dato	Vetoryl-dosis	Antal behandlinger /dag	Kliniske Cushing-point				Andre observerede symptomer af betydning (f.eks. diarré, appetitløshed m.m.)
			Tørst/ Vandladning	Appetit	Udseende	Aktivitets-niveau	



Tip: Giv altid Vetoryl sammen med mad for at sikre, at medicinen optages bedst muligt.



Kliniske Cushing-point

Dato	Vetoryl-dosis	Antal behandlinger /dag	Kliniske Cushing-point				Andre observerede symptomer af betydning (f.eks. diarré, appetitløshed m.m.)
			Tørst/ Vandladning	Appetit	Udseende	Aktivitets-niveau	



Ved du, at du ikke bør dele Vetoryl-kapslen?

Kliniske Cushing-point

Dato	Vetoryl-dosis	Antal behandlinger /dag	Kliniske Cushing-point				Andre observerede symptomer af betydning (f.eks. diarré, appetitløshed m.m.)
			Tørst/ Vandladning	Appetit	Udseende	Aktivitets-niveau	



Tip: Vær opmærksom på, hvornår på døgnet din hunds symptomer er værst. Tisser din hund om natten, eller er det værst i løbet af dagen? Tal med din dyrlæge.



Kliniske Cushing-point

Dato	Vetoryl-dosis	Antal behandlinger /dag	Kliniske Cushing-point				Andre observerede symptomer af betydning (f.eks. diarré, appetitløshed m.m.)
			Tørst/ Vandladning	Appetit	Udseende	Aktivitets-niveau	



Vidste du, at der findes en række alvorlige følgesygdomme af Cushings syndrom såsom sukkersyge, betændelse i bugspytkirtlen og forhøjet blodtryk? Det er derfor vigtigt, at du ikke springer opfølgingskonsultationer hos dyrlægen over, og at sygdommen er velkontrolleret.

Kliniske Cushing-point

Dato	Vetoryl-dosis	Antal behandlinger /dag	Kliniske Cushing-point				Andre observerede symptomer af betydning (f.eks. diarré, appetitløshed m.m.)
			Tørst/ Vandladning	Appetit	Udseende	Aktivitets-niveau	



Vil du vide mere om vores specialtilpassede foder til hunde med hormonelle sygdomme? Gå til følgende link:

www.specific-diets.dk/hund/specialfoder/endocrine-support-ced-dm-dk

Kliniske Cushing-point

Dato	Vetoryl-dosis	Antal behandlinger /dag	Kliniske Cushing-point				Andre observerede symptomer af betydning (f.eks. diarré, appetitløshed m.m.)
			Tørst/ Vandladning	Appetit	Udseende	Aktivitets-niveau	



Vidste du, at Vetoryl er det eneste godkendte lægemiddel til hunde med Cushings syndrom?

Kliniske Cushing-point

Dato	Vetoryl-dosis	Antal behandlinger /dag	Kliniske Cushing-point				Andre observerede symptomer af betydning (f.eks. diarré, appetitløshed m.m.)
			Tørst/ Vandladning	Appetit	Udseende	Aktivitets-niveau	



Tip: Hvis din hund udviser sygdomstegn, såsom træthed, opkastning, diarré eller nedsat appetit, under behandlingen med Vetoryl, skal du omgående stoppe behandlingen og kontakte din dyrlæge.



Kliniske Cushing-point

Dato	Vetoryl-dosis	Antal behandlinger /dag	Kliniske Cushing-point				Andre observerede symptomer af betydning (f.eks. diarré, appetitløshed m.m.)
			Tørst/ Vandladning	Appetit	Udseende	Aktivitets-niveau	



Vidste du, at du ikke bør håndtere Vetoryl-kapsler, hvis du er gravid eller planlægger at blive gravid?

Spørgeskema om livskvalitet ved Cushings syndrom

	Aldrig	Af og til	Ofte	Hele tiden
KLINISK PÅVIRKNING	0	1	2	3
Min hund er voldsomt tørstig.				
Min hund tisser indenfor.				
Min hund er voldsomt sulten.				
Min hund puster/gisper voldsomt meget.				

	0	1	2	3
HUNDENS ADFÆRD				
Min hund er trist og inaktiv.				
Min hund mangler energi.				
Min hund vil ikke interagere med mennesker/hunde.				
Min hund vil ikke lege med mig.				
Min hund virker desorienteret/forvirret.				

	0	1	2	3
FYSISK PÅVIRKNING				
Jeg kæmper med min hunds vægt.				
Min hunds pels er i dårlig forfatning.				
Min hunds hud virker svækket (tør og udspændt).				
Min hund ser ud til at være i dårlig form (manglende muskelmasse, udspændt mave).				
Min hund har problemer med at gå lange ture.				

	0	1	2	3
PÅVIRKNING AF DIG SOM KÆLEDYRSEJER				
Jeg er bekymret for min hunds helbred.				
Mine og min hunds daglige rutiner forstyrres.				
Jeg kæmper med min hunds helbred.				
Jeg føler ikke, der er et bånd mellem os.				
Jeg oplever, at min hunds udseende fremkalder negative				

DATO		POINT I ALT	
-------------	--	--------------------	--

Spørgeskema om livskvalitet ved Cushings syndrom

	Aldrig	Af og til	Ofte	Hele tiden
KLINISK PÅVIRKNING	0	1	2	3
Min hund er voldsomt tørstig.				
Min hund tisser indenfor.				
Min hund er voldsomt sulten.				
Min hund puster/gisper voldsomt meget.				

	0	1	2	3
HUNDENS ADFÆRD	0	1	2	3
Min hund er trist og inaktiv.				
Min hund mangler energi.				
Min hund vil ikke interagere med mennesker/hunde.				
Min hund vil ikke lege med mig.				
Min hund virker desorienteret/forvirret.				

	0	1	2	3
FYSISK PÅVIRKNING	0	1	2	3
Jeg kæmper med min hunds vægt.				
Min hunds pels er i dårlig forfatning.				
Min hunds hud virker svækket (tør og udspændt).				
Min hund ser ud til at være i dårlig form (manglende muskelmasse, udspændt mave).				
Min hund har problemer med at gå lange ture.				

	0	1	2	3
PÅVIRKNING AF DIG SOM KÆLEDYRSEJER	0	1	2	3
Jeg er bekymret for min hunds helbred.				
Mine og min hunds daglige rutiner forstyrres.				
Jeg kæmper med min hunds helbred.				
Jeg føler ikke, der er et bånd mellem os.				
Jeg oplever, at min hunds udseende fremkalder negative				

DATO		POINT I ALT	
-------------	--	--------------------	--

Spørgeskema om livskvalitet ved Cushings syndrom

	Aldrig	Af og til	Ofte	Hele tiden
KLINISK PÅVIRKNING	0	1	2	3
Min hund er voldsomt tørstig.				
Min hund tisser indenfor.				
Min hund er voldsomt sulten.				
Min hund puster/gisper voldsomt meget.				

	0	1	2	3
HUNDENS ADFÆRD				
Min hund er trist og inaktiv.				
Min hund mangler energi.				
Min hund vil ikke interagere med mennesker/hunde.				
Min hund vil ikke lege med mig.				
Min hund virker desorienteret/forvirret.				

	0	1	2	3
FYSISK PÅVIRKNING				
Jeg kæmper med min hunds vægt.				
Min hunds pels er i dårlig forfatning.				
Min hunds hud virker svækket (tør og udspændt).				
Min hund ser ud til at være i dårlig form (manglende muskelmasse, udspændt mave).				
Min hund har problemer med at gå lange ture.				

	0	1	2	3
PÅVIRKNING AF DIG SOM KÆLEDYRSEJER				
Jeg er bekymret for min hunds helbred.				
Mine og min hunds daglige rutiner forstyrres.				
Jeg kæmper med min hunds helbred.				
Jeg føler ikke, der er et bånd mellem os.				
Jeg oplever, at min hunds udseende fremkalder negative				

DATO		POINT I ALT	
-------------	--	--------------------	--

Mere information:
www.mistankeomcushings.dk



Vetoryl 5 mg, 10 mg, 30 mg, 60 mg, 120 mg hårde kapsler. **Aktivt stof:** Trilostan. **Rx. ATCvet-kod:** QH02CA01. **Dyrearter:** Hund. **Indikationer:** Hos hunde: Til behandling af hypofysær- og adrenal-betinget hyperadrenocorticisme (Cushings syndrom). **Kontraindikationer:** Bør ikke anvendes til dyr, som lider af primær leversygdom og/eller nyreinsufficiens. Bør ikke anvendes til hunde, der vejer under 3 kg. **Særlige forsigtighedsregler for dyret:** Det er yderst vigtigt at stille en præcis diagnose for hyperadrenocorticisme. Da de fleste tilfælde af hyperadrenocorticisme konstateres hos hunde, der er mellem 10 og 15 år gamle, vil der ofte også være andre patologiske forandringer til stede. Det er især vigtigt at undersøge hundene for primær leversygdom og nyreinsufficiens, da produktet er kontraindiceret i disse tilfælde. Ved samtidig forekomst af diabetes mellitus og hyperadrenocorticisme kræves der en særlig overvågning. Produktet bør kun anvendes med stor forsigtighed til hunde med anæmi, idet der kan forekomme en yderligere reduktion af hæmatokrit og hæmoglobin-niveauet. Regelmæssig overvågning bør foretages. **Særlige forsigtighedsregler for personer, der administrerer lægemidlet:** Trilostan kan mindske syntesen af testosteron og har anti-progesterone egenskaber. Lægemidlet bør ikke håndteres af gravide kvinder, eller af kvinder der forsøger at blive gravide. Vask hænderne med vand og sæbe efter kontakt med kapslerne. **Bivirkninger:** Iatrogen Cushings syndrom eller hypokortisolæmi bør skelnes fra hypoadrenocorticisme ved evaluering af elektrolytter i serum. Symptomer, som skyldes iatrogen hypoadrenocorticisme, herunder svaghed, lethargi, anoreksi, opkastning og diarré, kan forekomme. Disse forekommer især, hvis hunden ikke er blevet overvåget tilstrækkeligt. Symptomerne er som oftest reversible og fortager sig indenfor en varierende tidsperiode efter ophørt behandling. Akut Addisons krise kan også forekomme. Lethargi, opkastning, diarré og anoreksi er observeret hos hunde behandlet med trilostan, uden at hypoadrenocorticisme kunne påvises. Der er rapporteret om enkelte pludselige dødsfald under behandlingen. Andre milde, sjældent forekommende bivirkninger inkluderer koordinationsbesvær, øget spytafsondring, oppustethed, muskelrystelser og hudforandringer. **Drægtighed eller diegivning:** Må ikke anvendes til drægtige eller diegivende tæver eller i nogen dyr til avl. Interaktion med andre lægemidler og andre former for interaktion: Muligheden for interaktion med andre lægemidler er ikke undersøgt specifikt. Hyperadrenocorticisme optræder hovedsageligt hos ældre hunde, og derfor vil mange få anden medicin under behandlingen. Under kliniske studier er der ikke observeret interaktioner. Risikoen for udvikling af hyperkalicæmi bør tages i betragtning, hvis trilostan anvendes sammen med kaliumsparende diuretika eller ACE-hæmmere. **Dosering og indgivelsesmåde:** Indgives oralt en gang om dagen sammen med foder. Startdosis for behandlingen er ca. 2 mg / kg/dag, i forhold til mulige kombinationer af kapselstørrelser. Dosistitrer i forhold til den individuelle respons som lægges fast gennem monitorering. Hvis symptomerne ikke er tilfredsstillende kontrolleret gennem en hel 24-timers periode mellem to doseringer, kan man i sidste ende overveje at forøge dosis med op til 50% og dele den fulde dagsdosis op på to daglige doser morgen og aften. Yderligere oplysninger om overvågning og opfølgning kan fås ved at kontakte producenten eller læse mere i SPC alt www.medicintil dyr.dk. **Pakningsstørrelser:** 5 mg, 10 mg, 30 mg, 60 mg, 120 mg hårde kapsler i blisterkarton 30 (3x10) st. **Indehaver af markedsføringstilladelsen:** Dechra Regulatory B. V. **Repræsentant:** Dechra Veterinary Products A/S. **Dato for ændring af teksten:** 26.08.2019. **Udleveringsbestemmelse:** B. **Ovenstående tekst er et forkortet resumé af sammendraget af produkt egenskaber. For yderligere information se venligst på www.medicintil dyr.dk eller kontakt www.dechra.dk. Dagsaktuel pris kan ses på www.medicinpriser.dk.**